

# COMPUTABILITÀ

Prof. Domenico Cantone

A.A. 2008/09

# PROGRAMMA

## I PARTE: TEORIA DELLA CALCOLABILITA'

### FUNZIONI CALCOLABILI

- ALGORITMI, PROCEDURE EFFETTIVE
- IL MODELLO URM (UNLIMITED REGISTER MACHINE)
- FUNZIONI URM-CALCOLABILI
- PREDICATI E PROBLEMI DECIDIBILI
- CALCOLABILITA' SU ALTRI DOMINI

## GENERAZIONE DI FUNZIONI CALCOLABILI

- FUNZIONI CALCOLABILI DI BASE
- UNIONE DI PROGRAMMI
- SOSTITUZIONE
- RICORSIONE
- MINIMALIZZAZIONE

## TESI DI CHURCH

- ALTRI APPROCCI ALLA CALCOLABILITÀ
- FUNZIONI PARZIALMENTE RICORSIVE
- FUNZIONI PRIMITIVE RICORSIVE
- MACCHINE DI TURING
- (SISTEMI DI POST E MARKOV)
- TESI DI CHURCH-TURING

# ENUMERAZIONE DELLE FUNZIONI CALCOLABILI E I PROGRAMMI UNIVERSALI

- IL METODO DIAGONALE
- IL TEOREMA S-M-N
- FUNZIONI E PROGRAMMI UNIVERSALI
- DUE APPLICAZIONI DEL PROGRAMMA UNIVERSALE
- PROBLEMI INDECIDIBILI
- TEOREMA DI RICORSIONE

## LIBRO DI TESTO:

N.J. CUTLAND: "COMPUTABILITY",  
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1986.

# TEORIA DELLA CALCOLABILITÀ

## CENNI STORICI:


NASCE CON I LAVORI DI ALAN TURING E ALONZO CHURCH CHE INTORNO AL 1936 HANNO DATO UNA SOLUZIONE NEGATIVA AL PROBLEMA DELLA DECISIONE PER LA LOGICA DEL I ORDINE CONSIDERATO DA DAVID HILBERT TRA I PROBLEMI PIU' IMPORTANTI DEL SUO TEMPO

- PER RISOLVERE **IN POSITIVO** UN PROBLEMA ALGORITMICO E' SUFFICIENTE ESIBIRE UNA PROCEDURA IN UN FORMALISMO ACCETTABILE.

- ES.
- ALGORITMO DI EUCLIDE
  - ALGORITMI PER LE 4 OPERAZIONI SUI NUMERI INTERI
  - ALGORITMO DI FATTORIZZAZIONE
  - CRIVELLO DI ERATOSTENE
  - TEST DI DIVISIBILITA'
  - ...

ESEMPIO: TEST DI DIVISIBILITA':  $y$  E' DIVISIBILE PER  $x$ ?

FORMALISMO: DIAGRAMMI DI FLUSSO  $\exists z: y = xz?$



- SI PUO' DIMOSTRARE CHE:

• IL PROCESSO DI CALCOLO TERMINA SEMPRE

• SE L'OUTPUT E' 1 E L'ASSEGNAIMENTO  $y \leftarrow y - x$  E' ESEGUITO  $z$  VOLTE, ALLORA VALE  $y = z \cdot x$

• SE L'OUTPUT E' 0 ALLORA  $y$  NON E' DIVISIBILE PER  $x$

QUINDI IL TEST DI DIVISIBILITA' E' COMPUTABILE




## ESEMPIO

SI CONSIDERI LA FUNZIONE

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{SE L'ESPANSIONE DECIMALE DI } \pi \text{ CONTIENE} \\ & \text{ESATTAMENTE } x \text{ CIFRE CONSECUTIVE EGUALI} \\ 0 & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

PUR DISPONENDO DI UNA PROCEDURA FINITA CHE PER OGNI  $n$  CALCOLA L'ESPANSIONE DI  $\pi$  CON  $n$  CIFRE DECIMALI, ALLO STATO ATTUALE DELLE CONOSCENZE NON SI DISPONE DI UN PROCESSO DI CALCOLO PER  $f$ .

ESEMPIO (CONTINUA)



• POICHE' LA PROCEDURA A LATO NON SI FERMA QUANDO  $f(x) = 0$ , ESSA NON E' UNA PROCEDURA DI CALCOLO PER  $f$

---> OUTPUT 0

- PER RISOLVERE IN NEGATIVO UN PROBLEMA ALGORITMICO E' NECESSARIO AVERE UN'IDEA CHIARA DI TUTTI I POSSIBILI ALGORITMI E QUINDI FARE VEDERE CHE CIASCUNO DI ESSI NON E' IN GRADO DI RISOLVERE IL PROBLEMA IN ESAME

- OCCORRE QUINDI FORMALIZZARE IL CONCETTO INTUITIVO DI ALGORITMO:

SEQUENZA DI ISTRUZIONI CIASCUNA DELLE QUALI PUO' ESSERE ESEGUITA IN MANIERA NON AMBIGUA ED EFFETTIVA DA UN'OPPORTUNA MACCHINA

- IL PROBLEMA DIVENTA ALLORA QUELLO DI FORMALIZZARE UN OPPORTUNO MODELLO DI CALCOLO UNIVERSALE (MACCHINA)

- SONO STATI PROPOSTI PARECCHI MODELLI:

- MACCHINE DI TURING (TURING, 1936)
- $\lambda$ -CALCOLO (CHURCH, 1936)
- FUNZIONI PARZIALI RICORSIVE (GÖDEL-KLEENE, 1936)
- SISTEMI DEDUTTIVI CANONICI (POST, 1945)
- SISTEMI DI MARKOV (MARKOV, 1951)
- MACCHINE A REGISTRI ILLIMITATI (URM)

(SHEPHERDSON & STURGIS, 1936)

- CIASCUNO DI TALI SISTEMI DA' LUOGO AD UNA DEFINIZIONE DI FUNZIONI CALCOLABILI (OVVERO DI PROBLEMI RISOLVIBILI IN MANIERA EFFETTIVA)
- E' INTERESSANTE OSSERVARE CHE TUTTI I SUDDETTI MODELLI DI CALCOLO DEFINISCONO LA MEDESIMA CLASSE DI FUNZIONI CALCOLABILI

### TESI DI CHURCH-TURING

UNA FUNZIONE E' CALCOLABILE SE E SOLO SE E' CALCOLABILE IN UNO DEI SUDDETTI/ MODELLI DI CALCOLO.

# UNLIMITED REGISTER MACHINES (URM)

(MACCHINE A REGISTRI ILLIMITATI)

- SI TRATTA DI UNA VARIANTE DELLE MACCHINE DI SHEPHERDSON & STURGIS [1963]
- UNA URM E' DOTATA DI UN ARRAY INFINITO DI REGISTRI  $R_1, R_2, R_3, \dots$  CIASCUNO DEI QUALI CONTIENE UN NUMERO NATURALE (INTERO NON NEGATIVO)  $r_1, r_2, r_3, \dots$

$R_1$	$R_2$	$R_3$	$R_4$	$R_5$	$R_6$	$R_7$	...
$r_1$	$r_2$	$r_3$	$r_4$	$r_5$	$r_6$	$r_7$	...

- LO STATO DI UNA URM E' IL CONTENUTO DEI SUOI REGISTRI:  $\vec{r} \in \mathbb{N}^{\infty}$

- LO STATO DI UNA URM PUO' ESSERE MODIFICATO DALL'ESECUZIONE DI UN URM-PROGRAMMA
  - UN URM-PROGRAMMA E' UNA SEQUENZA FINITA  $I_1, I_2, \dots, I_s$  DI ISTRUZIONI DI UNO DEI SEGUENTI QUATTRO TIPI:
    - RESET
    - INCREMENTO
    - (ASSEGNAMENTO)
    - SALTO CONDIZIONATO
- ( $s$  E' LA LUNGHEZZA DEL PROGRAMMA)

- UNA CONFIGURAZIONE ISTANTANEA È UNA COPPIA  $(k, \vec{r}) \in \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^\infty$  CON

- $k$  INTERO POSITIVO, DETTO CONTATORE DI PROGRAMMA
- $\vec{r}$  STATO

(INFORMALMENTE,  $k$  RAPPRESENTA L'INDICE DELLA ISTRUZIONE CHE STA PER ESSERE ESEGUITA QUANDO LO STATO DEI REGISTRI È  $\vec{r}$ )

### ESEMPIO

$(5, (1, 0, 0, \dots))$

È UNA CONFIGURAZIONE  
ISTANTANEA



## ISTRUZIONI DI RESET

$Z(m)$  ( $m \in \mathbb{N}^+$ )

$[R_m \leftarrow 0]$

Semantica:  $(k, \vec{r}) \xrightarrow{Z(m)} (k+1, \vec{r}')$  con  $r'_i = \begin{cases} r_i, & i \neq m \\ 0, & i = m \end{cases}$

## ESEMPIO

$R_1$	$R_2$	$R_3$	$R_4$	$R_5$	$R_6$	...
9	6	5	23	7	0	...

$\downarrow Z(3)$

$R_1$	$R_2$	$R_3$	$R_4$	$R_5$	$R_6$	...
9	6	0	23	7	0	...

## ISTRUZIONI DI INCREMENTO

$S(m)$  ( $m \in \mathbb{N}^+$ )

$[R_m \leftarrow R_{m+1}]$

SEMANTICA:  $(k, \vec{r}) \xrightarrow{S(m)} (k+1, \vec{r}')$  CON  $r'_i = \begin{cases} r_i, & i \neq m \\ r_{m+1}, & i = m \end{cases}$

## ESEMPIO

$k=5$

$R_1$	$R_2$	$R_3$	$R_4$	$R_5$	$R_6$	...
9	6	0	23	7	0	...

$\downarrow S(5)$

$k=6$

$R_1$	$R_2$	$R_3$	$R_4$	$R_5$	$R_6$	...
9	6	0	23	8	0	...

## ISTRUZIONI DI ASSEGNAMENTO

$T(m, n)$  ( $m, n \in \mathbb{N}^+$ )  $[ R_m \leftarrow R_m ]$

SEMANTICA:  $(k, \vec{r}) \xrightarrow{T(m, m)} (k+1, \vec{r}')$  CON  $r'_i = \begin{cases} r_i, & i \neq m \\ r_m, & i = m \end{cases}$

## ESEMPIO

$k=5$

$R_1$	$R_2$	$R_3$	$R_4$	$R_5$	$R_6$	...
9	6	0	23	8	0	...

$\downarrow T(5, 1)$

$k=6$

$R_1$	$R_2$	$R_3$	$R_4$	$R_5$	$R_6$	...
8	6	0	23	8	0	...

## ISTRUZIONI DI SALTO CONDIZIONATO

$J(m, n, q)$  ( $m, n, q \in \mathbb{N}^+$ ) [if  $R_m = R_n$  then goto  $q$ ]

SEMANTICA:  $(k, \vec{r}) \xrightarrow{J(m, n, q)} (k', \vec{r})$  con  $k' = \begin{cases} q, & r_m = r_n \\ k+1, & r_m \neq r_n \end{cases}$

### ESEMPIO

$k=5$

$R_1$	$R_2$	$R_3$	$R_4$	$R_5$	$R_6$	...
8	6	0	23	8	0	...

$\downarrow J(5, 1, 9)$

$k'=9$

$R_1$	$R_2$	$R_3$	$R_4$	$R_5$	$R_6$	...
8	6	0	23	8	0	...

## COMPUTAZIONI

- DATI

- $P = I_1, I_2, \dots, I_s$  (PROGRAMMA DI LUNGHEZZA  $s$ )
- $\vec{r}$  (STATO DEI REGISTRI)

LA COMPUTAZIONE  $P(\vec{r})$  DI  $P$  A PARTIRE DALLO STATO INIZIALE  $\vec{r}$  E' LA SEQUENZA (FINITA O INFINITA) DI CONFIGURAZIONI Istantanee

$(k_1, \vec{r}^{(1)})$ ,  $(k_2, \vec{r}^{(2)})$ ,  $(k_3, \vec{r}^{(3)})$ , ...

TALE CHE

## COMPUTAZIONI (CONTINUA)

■  $k_1 = 1, \vec{r}^{(1)} = \vec{r}$

CIÒÈ LA COMPUTAZIONE INIZIA CON LA PRIMA ISTRUZIONE DI  $P$  E CON LO STATO INIZIALE  $\vec{r}$

■ SE  $(k_i, \vec{r}^{(i)})$  È L'  $i$ -ESIMA CONFIGURAZIONE ISTANTANEA DELLA COMPUTAZIONE  $P(\vec{r})$  ALLORA

▲ SE  $k_i \leq s, (k_i, \vec{r}^{(i)})$  HA SUCCESSORE IN  $P(\vec{r})$

E SI HA  $(k_i, \vec{r}^{(i)}) \xrightarrow{I_{k_i}} (k_{i+1}, \vec{r}^{(i+1)})$

▲ SE  $k_i > s, (k_i, \vec{r}^{(i)})$  NON HA SUCCESSORE

IN  $P(\vec{r})$  (CIÒÈ  $(k_i, \vec{r}^{(i)})$  È LA CONFIGURAZIONE FINALE DI  $P(\vec{r})$ )

## ESEMPIO

$I_1 : J(1,2,6)$

$I_2 : S(2)$

$I_3 : S(3)$

$I_4 : J(1,2,6)$

$I_5 : J(1,1,2)$

$I_6 : T(3,1)$

if  $R_1 = R_2$  then goto 6


[2]  $R_2 \leftarrow R_2 + 1$

$R_3 \leftarrow R_3 + 1$

if  $R_1 = R_2$  then goto 6

if  $R_1 = R_1$  then goto 2

[6]  $R_1 \leftarrow R_3$



stato iniziale

R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R <sub>3</sub>	R <sub>4</sub>	R <sub>5</sub>	...
9	7	0	0	0	...

1.  $J(1,2,6)$

9	7	0	0	0	...
---	---	---	---	---	-----

2.  $S(2)$

9	8	0	0	0	...
---	---	---	---	---	-----

3.  $S(3)$

9	8	1	0	0	...
---	---	---	---	---	-----

4.  $J(1,2,6)$

9	8	1	0	0	...
---	---	---	---	---	-----

5.  $J(1,1,2)$

9	8	1	0	0	...
---	---	---	---	---	-----

2.  $S(2)$

R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R <sub>3</sub>	R <sub>4</sub>	R <sub>5</sub>	...
9	9	1	0	0	...

3.  $S(3)$

9	9	2	0	0	...
---	---	---	---	---	-----

4.  $J(1,2,6)$

9	9	2	0	0	...
---	---	---	---	---	-----

6.  $T(3,1)$

2	9	2	0	0	...
---	---	---	---	---	-----

7.

↑  
stato finale

-SI TRATTA DI UNA COMPUTAZIONE FINITA O  
TERMINANTE



stato iniziale

R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R <sub>3</sub>	R <sub>4</sub>	R <sub>5</sub>	...
6	7	0	0	0	...

1. J(1,2,6) →

6	7	0	0	0	...
---	---	---	---	---	-----

2. S(2) →

6	8	0	0	0	...
---	---	---	---	---	-----

3. S(3) →

6	8	1	0	0	...
---	---	---	---	---	-----

4. J(1,2,6) →

6	8	1	0	0	...
---	---	---	---	---	-----

5. J(1,1,2) →

6	8	1	0	0	...
---	---	---	---	---	-----

2. S(2) →

R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R <sub>3</sub>	R <sub>4</sub>	R <sub>5</sub>	...
6	9	1	0	0	...

3. S(3) →

6	9	2	0	0	...
---	---	---	---	---	-----

4. J(1,2,6) →

6	9	2	0	0	...
---	---	---	---	---	-----

5. J(1,1,2) →

6	9	2	0	0	...
---	---	---	---	---	-----

2. S(2) →

6	10	2	0	0	...
---	----	---	---	---	-----

3. S(3) →

6	10	3	0	0	...
---	----	---	---	---	-----

...

...

- SI DIMOSTRA CHE TALE COMPUTAZIONE E' **INFINITA** CIOE' **NON TERMINANTE**

## ALCUNE NOTAZIONI UTILI

- SIA  $P$  UN PROGRAMMA ED  $\vec{r}$  UNO STATO (INIZIALE) DEI REGISTRI.
- SE LA COMPUTAZIONE  $P(\vec{r})$  E' TERMINANTE SCRIVEREMO  $P(\vec{r}) \downarrow$
- SE LA COMPUTAZIONE  $P(\vec{r})$  E' NON TERMINANTE SCRIVEREMO  $P(\vec{r}) \uparrow$
- CON LA NOTAZIONE  $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$  INDICHEREMO LA COMPUTAZIONE  $P(\vec{r})$  DOVE
$$r_i = \begin{cases} a_i & \text{SE } i \leq n \\ 0 & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

## CONVENZIONI DI INPUT E OUTPUT

- SIA  $P(a_1, a_2, \dots, a_n) \downarrow$ .

L'OUTPUT DI  $P$  SU INPUT  $a_1, a_2, \dots, a_n$  È IL CONTENUTO DEL REGISTRO  $R_1$  NELLO STATO FINALE DELLA COMPUTAZIONE  $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ .

- SCRIVEREMO  $P(a_1, a_2, \dots, a_n) \downarrow b$  PER INDICARE CHE  $b$  È L'OUTPUT DELLA COMPUTAZIONE  $P(a_1, \dots, a_n)$ .

- SIA  $f: A \rightarrow B$  UNA FUNZIONE PARZIALE  
TALE CIOE' CHE  $\text{Dom}(f) \subseteq A$

- SE  $f$  E' DEFINITA SU  $a$  SCRIVEREMO  $f(a) \downarrow$   
ALTRIMENTI SCRIVEREMO  $f(a) \uparrow$

- SIANO  $f, g: A \rightarrow B$  FUNZIONI PARZIALI,  
SCRIVEREMO  $f \simeq g$  PER INDICARE CHE

1) PER OGNI  $a \in A$  :  $f(a) \downarrow$  SE E SOLO SE  $g(a) \downarrow$

2) PER OGNI  $a \in A$  : SE  $f(a) \downarrow$  ALLORA  $f(a) = g(a)$

- SIA  $P$  UN PROGRAMMA.
- PER OGNI  $n \geq 1$  PONIAMO

$$f_P^{(n)}(a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{cases} b & \text{SE } P(a_1, a_2, \dots, a_n) \downarrow b \\ \uparrow & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

- LA FUNZIONE (PARZIALE)  $f_P^{(n)}: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$  E' LA FUNZIONE  $n$ -ARIA CALCOLATA DA  $P$
- UNA FUNZIONE PARZIALE  $g: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$  SI DICE URM-CALCOLABILE SE ESISTE UN PROGRAMMA URM  $P$  TALE CHE  $g = f_P^{(n)}$

- INDICHEREMO CON  $\mathcal{C}$  LA COLLEZIONE DI TUTTE  
LE FUNZIONI URM-CALCOLABILI (DI QUALUNQUE  
ARIETA')

- INDICHEREMO CON  $\mathcal{C}_m$  LA COLLEZIONE DI TUTTE  
LE FUNZIONI  $n$ -ARIE URM-CALCOLABILI

- PERTANTO VALE

$$\mathcal{C} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{C}_n$$

# ESEMPLI


$\lambda xy. x+y$

$I_1 J(3, 2, 5)$

$I_2 S(1)$

$I_3 S(3)$

$I_4 J(1, 1, 1)$



- E' FACILE VERIFICARE CHE IL PROGRAMMA

$$I_1 : J(1,2,6)$$

$$I_2 : S(2)$$

$$I_3 : S(3)$$

$$I_4 : J(1,2,6)$$

$$I_5 : J(1,1,2)$$

$$I_6 : T(3,1)$$

CALCOLA LA FUNZIONE BINARIA

$$f(x,y) = \begin{cases} x - y & \text{SE } x \geq y \\ \uparrow & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$



## ALCUNI ESEMPI

- SI CONSIDERI LA FUNZIONE  $x + y$
- IL SEGUENTE PROGRAMMA CALCOLA  $x + y$

1:  $J(2, 3, 5)$


2:  $S(1)$

3:  $S(3)$

4:  $J(1, 1, 1)$

STATO TIPICO

$R_1$   $R_2$   $R_3$   $R_4$   $R_5$



- SI CONSIDERI LA FUNZIONE

- IL SEGUENTE PROGRAMMA

1:  $J(1, 2, 8)$

2:  $S(2)$

3:  $J(1, 2, 7)$

4:  $S(2)$

5:  $S(3)$

6:  $J(1, 1, 3)$

7:  $T(3, 1)$


STATO TIPICO

$R_1$   $R_2$   $R_3$   $R_4$   $R_5$



$$x \div 1 = \begin{cases} x-1 & \text{SE } x \geq 1 \\ 0 & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

CALCOLA  $x \div 1$



- SI CONSIDERI LA FUNZIONE

$$f(x) = \begin{cases} 1/2x & \text{SE } x \text{ È PARI} \\ \uparrow & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

- IL SEGUENTE PROGRAMMA CALCOLA  $f$

1:  $J(1, 2, 6)$

2:  $S(2)$

3:  $S(2)$


4:  $S(3)$

5:  $J(1, 1, 1)$

6:  $T(3, 1)$

STATO TIPICO

$R_1$	$R_2$	$R_3$	$R_4$	$R_5$	...
$x$	$2k$	$k$	$0$	$0$	...



# ESERCIZI

1. SI DIMOSTRI CHE LE SEGUENTI FUNZIONI SONO CALCOLABILI ESIBENDO OPPORTUNI PROGRAMMI URM

$$(a) \quad f(x) = \begin{cases} 0 & \text{SE } x = 0 \\ 1 & \text{SE } x \neq 0 \end{cases}$$

$$(b) \quad f(x) = 5$$

$$(c) \quad f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{SE } x = y \\ 1 & \text{SE } x \neq y \end{cases}$$

$$(d) \quad f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{SE } x \leq y \\ 1 & \text{SE } x > y \end{cases}$$

$$(e) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}x & \text{SE } x \text{ E' UN MULTIPLO DI } 3 \\ \uparrow & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

$$(f) f(x) = \lfloor \frac{2x}{3} \rfloor$$

2. SIA  $P$  UN PROGRAMMA URM CHE NON CONTIENE ALCUNA ISTRUZIONE DEL TIPO  $J(m, n, p)$ .  
SI DIMOSTRI CHE ESISTE  $m \in \mathbb{N}$  TALE CHE:

$$- f_p^{(1)}(x) = m \quad \forall x \in \mathbb{N}, \quad \text{OPPURE}$$

$$- f_p^{(1)}(x) = x + m \quad \forall x \in \mathbb{N},$$

3. DATO UN PROGRAMMA URM  $P$  SI DIMOSTRI CHE  
ESISTE UN ALTRO PROGRAMMA URM  $P'$  TALE CHE

-  $P'$  NON CONTIENE ALCUNA ISTRUZIONE  
DEL TIPO  $T(m, m)$

-  $f_P^{(m)}(\vec{x}) = f_{P'}^{(m)}(\vec{x})$ ,  $\forall \vec{x} \in \mathbb{N}^m$

CORRETTEZZA PARZIALE

E TOTALE DI

PROGRAMMI URM

UN PROGRAMMA  $P$  SI DICE PARZIALMENTE CORRETTO  
RISPETTO A DATE SPECIFICHE DI INPUT  $a$  E DI  
OUTPUT  $B$  SE


- PER OGNI INPUT  $\vec{x}$  SODDISFACENTE LE SPECIFICHE  $a$ ,  
SE L'ESECUZIONE DI  $P$  SU  $\vec{x}$  E' TERMINANTE,  
ALLORA L'OUTPUT DI  $P$  SODDISFA LE SPECIFICHE  $B$



# ESEMPI

- $\lambda xy. x+y$
- $I_1 J(3, 2, 5)$
- $I_2 S(1)$
- $I_3 S(3)$
- $I_4 J(1, 1, 1)$

CONDIZIONI INIZIALI  
 $\left\{ \begin{array}{l} r_1 = \bar{r}_1 \\ r_2 = \bar{r}_2 \\ r_3 = 0 \end{array} \right\}$



CONDIZIONE FINALE  
 $\{r_1 = \bar{r}_1 + \bar{r}_2\}$

DEBBONO VALERE

CONDIZIONI INIZIALI  $\Rightarrow$  A

$A \wedge r_3 = r_2 \Rightarrow$  CONDIZIONE FINALE

$(A \wedge r_3 \neq r_2 \wedge r'_1 = r_1 + 1 \wedge r'_3 = r_3 + 1 \wedge r'_2 = r_2) \rightarrow A \begin{matrix} r_1 & r_2 & r_3 \\ r'_1 & r'_2 & r'_3 \end{matrix}$

## ESEMPI

$$\lambda xy. x+y$$

$$I_1 J(3, 2.5)$$


$$I_2 S(1)$$

$$I_3 S(3)$$

$$I_4 J(1, 1, 1)$$

CONDIZIONI  
INIZIALI

$$\left\{ \begin{array}{l} r_1 = \bar{r}_1 \\ r_2 = \bar{r}_2 \\ r_3 = 0 \end{array} \right.$$



DOPO  $k$  CICLI:

$$\left. \begin{array}{l} r_1^{(k)} = \bar{r}_1 + k \\ r_2^{(k)} = \bar{r}_2 \\ r_3^{(k)} = k \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} r_1^{(k)} = \bar{r}_1 + r_3^{(k)} \\ r_2^{(k)} = \bar{r}_2 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$A = \left\{ \begin{array}{l} r_1 = \bar{r}_1 + r_3 \\ r_2 = \bar{r}_2 \end{array} \right.$$

CONDIZIONI  
INIZIALI

$\Rightarrow$  A

$$\begin{cases} r_1 = \bar{r}_1 \\ r_2 = \bar{r}_2 \\ r_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} r_1 = \bar{r}_1 + r_3 \\ r_2 = \bar{r}_2 \end{cases}$$

INFATTI:  $r_1 = \bar{r}_1 = \bar{r}_1 + 0 = \bar{r}_1 + r_3$

---

A  $\wedge$   $r_3 = r_2 \Rightarrow$  CONDIZIONE FINALE

INFATTI:

$$\begin{cases} r_1 = \bar{r}_1 + r_3 \\ r_2 = \bar{r}_2 \end{cases}$$

$$\wedge r_3 = r_2 \Rightarrow r_1 = \bar{r}_1 + r_3 = \bar{r}_1 + r_2 = \bar{r}_1 + \bar{r}_2$$

(CONDIZIONE FINALE)

$$(A \wedge r_3 \neq r_2 \wedge r'_1 = r_1 + 1 \wedge r'_3 = r_3 + 1 \wedge r'_2 = r_2) \rightarrow A \begin{matrix} r_1 & r_2 & r_3 \\ r'_1 & r'_2 & r'_3 \end{matrix}$$

INFATTI:

$$\left. \begin{matrix} r_1 = \bar{r}_1 + r_3 \\ r_2 = \bar{r}_2 \end{matrix} \right\} \wedge r_3 \neq r_2 \wedge r'_1 = r_1 + 1 \wedge r'_3 = r_3 + 1 \wedge r'_2 = r_2$$

$$\rightarrow \left. \begin{matrix} r'_1 = r_1 + 1 = \bar{r}_1 + r_3 + 1 = \bar{r}_1 + r'_3 \\ r'_2 = r_2 = \bar{r}_2 \end{matrix} \right\} \equiv \left. \begin{matrix} r'_1 = \bar{r}_1 + r'_3 \\ r'_2 = \bar{r}_2 \end{matrix} \right\}$$

$$\equiv A \begin{matrix} r_1 & r_2 & r_3 \\ r'_1 & r'_2 & r'_3 \end{matrix}$$

PERTANTO IL NOSTRO PROGRAMMA E' PARZIALMENTE  
CORRETTO, RISPETTO ALLE SPECIFICHE DATE SULLE  
CONDIZIONI INIZIALI E QUELLE FINALI

PER DIMOSTRARE LA TOTALE CORRETTEZZA, OCCORRE  
VERIFICARE CHE IL NOSTRO PROGRAMMA SI FERMA SEMPRE  
(TERMINAZIONE)

E' SUFFICIENTE TROVARE UNA MISURA A VALORI IN UN  
INSIEME BEN FONDATA CHE DECRESCA STRETTAMENTE  
AD OGNI ITERAZIONE.

SPESSE COME INSIEME BEN FONDATA SI PUO' SCEGLIERE  $N$

NEL NOSTRO CASO, C'E' UN'ESPRESSIONE NATURALE DEI NOSTRI  
REGISTRI CHE DECRESCA STRETTAMENTE AD OGNI ITERAZIONE?

UNA POSSIBILE FUNZIONE MISURA NEL NOSTRO CASO  
E':  $r_2 - r_3$

MA OCCORRERA' VERIFICARE CHE VALGONO SEMPRE

(a)  $r_2 - r_3 \in \mathbb{N}$  , CIOE'  $r_2 - r_3 \geq 0$

(b)  $r_2' - r_3' < r_2 - r_3$

A TAL FINE E' UTILE RAFFORZARE L'INVARIANTE :

$$B \equiv A \wedge r_2 - r_3 \geq 0 \equiv \left\{ \begin{array}{l} r_1 = \bar{r}_1 + r_3 \\ r_2 = \bar{r}_2 \\ r_2 - r_3 \geq 0 \end{array} \right\}$$

E QUINDI VERIFICARE CHE:

CONDIZIONI INIZIALI  $\Rightarrow B$

$B \wedge r_3 = r_2 \Rightarrow$  CONDIZIONE FINALE

$(B \wedge r_3 \neq r_2 \wedge r_1' = r_1 + 1 \wedge r_3' = r_3 + 1 \wedge r_2' = r_2) \rightarrow B_{\substack{r_1' r_2' r_3' \\ r_1 r_2 r_3}}$

AD ESEMPIO, VERIFICHIAMO LA CONDIZIONE (b)

$$(B \wedge r_3 \neq r_2 \wedge r'_3 = r_3 + 1 \wedge r'_1 = r_3 + 1 \wedge r'_2 = r_2) \\ \rightarrow (r'_2 - r'_3 < r_2 - r_3)$$

BANALMENTE SI HA:

$$r'_2 - r'_3 = r_2 - r_3 - 1 < r_2 - r_3$$



# ESEMPIO

$I_1 : J(1, 2, 6)$

$I_2 : S(2)$

$I_3 : S(3)$

$I_4 : J(1, 2, 6)$

$I_5 : J(1, 1, 2)$

$I_6 : T(3, 1)$

if  $R_1 = R_2$  then goto 6

[2]  $R_2 \leftarrow R_2 + 1$

$R_3 \leftarrow R_3 + 1$

if  $R_1 = R_2$  then goto 6


if  $R_1 = R_1$  then goto 2

[6]  $R_1 \leftarrow R_3$

CONDIZIONI INIZIALI

$$\left\{ \begin{array}{l} r_1 = \bar{r}_1 \\ r_2 = \bar{r}_2 \\ r_3 = 0 \end{array} \right\}$$

- (CONDIZIONI INIZIALI  $\wedge r_1 = r_2 \wedge r'_1 = r_3 \wedge r'_2 = r_2 \wedge r'_3 = r_3$ )  $\rightarrow r'_1 = \bar{r}_1 - \bar{r}_2$
- (CONDIZIONI INIZIALI  $\wedge r_1 \neq r_2 \wedge r'_1 = r_1 \wedge r'_2 = r_2 + 1 \wedge r'_3 = r_3 + 1$ )  $\rightarrow A \begin{matrix} r_1 & r_2 & r_3 \\ r'_1 & r'_2 & r'_3 \end{matrix}$
- ( $A \wedge r_1 \neq r_2 \wedge r'_1 = r_1 \wedge r'_2 = r_2 + 1 \wedge r'_3 = r_3 + 1$ )  $\rightarrow A \begin{matrix} r_1 & r_2 & r_3 \\ r'_1 & r'_2 & r'_3 \end{matrix}$
- ( $A \wedge r_1 = r_2 \wedge r'_1 = r_3 \wedge r'_2 = r_2 \wedge r'_3 = r_3$ )  $\rightarrow r'_1 = \bar{r}_1 - \bar{r}_2$



CONDIZIONE FINALE

$$\{ r'_1 = \bar{r}_1 - \bar{r}_2 \}$$

• (CONDIZIONI INIZIALI  $\wedge r_1 = r_2 \wedge r'_1 = r_3 \wedge r'_2 = r_2 \wedge r'_3 = r_3$ )  $\rightarrow r'_1 = \bar{r}_1 - \bar{r}_2$

$$\left( \begin{cases} r_1 = \bar{r}_1 \\ r_2 = \bar{r}_2 \\ r_3 = 0 \end{cases} \wedge r_1 = r_2 \wedge r'_1 = r_3 \wedge r'_2 = r_2 \wedge r'_3 = r_3 \right) \rightarrow$$

$$r'_1 = r_3 = 0 = r_1 - r_2 = \bar{r}_1 - \bar{r}_2$$



# ESEMPIO

$I_1 : J(1,2,6)$

$I_2 : S(2)$

$I_3 : S(3)$

$I_4 : J(1,2,6)$

$I_5 : J(1,1,2)$

$I_6 : T(3,1)$

CONDIZIONI INIZIALI  $\left\{ \begin{array}{l} r_1 = \bar{r}_1 \\ r_2 = \bar{r}_2 \\ r_3 = 0 \end{array} \right\}$   
 if  $R_1 = R_2$  then goto 6

[2]  $R_2 \leftarrow R_2 + 1$

$R_3 \leftarrow R_3 + 1$

if  $R_1 = R_2$  then goto 6

if  $R_1 = R_3$  then goto 2


[6]  $R_1 \leftarrow R_3$

DOPO  $k$  CICLI:

$$\left. \begin{array}{l} r_1^{(k)} = \bar{r}_1 \\ r_2^{(k)} = \bar{r}_2 + k + 1 \\ r_3^{(k)} = k + 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} r_1^{(k)} = \bar{r}_1 \\ r_2^{(k)} = \bar{r}_2 + r_3^{(k)} \end{array} \right\} \Rightarrow A = \left\{ \begin{array}{l} r_1 = \bar{r}_1 \\ r_2 = \bar{r}_2 + r_3 \end{array} \right\}$$

CONDIZIONE FINALE

$$\left\{ r_1 = \bar{r}_1 - \bar{r}_2 \right\}$$



(CONDIZIONI INIZIALI  $\wedge r_1 \neq r_2 \wedge r'_1 = r_1 \wedge r'_2 = r_2 + 1 \wedge r'_3 = r_3 + 1$ )  $\rightarrow A \begin{matrix} r_1 & r_2 & r_3 \\ r'_1 & r'_2 & r'_3 \end{matrix}$

$$\left( \begin{matrix} r_1 = \bar{r}_1 \\ r_2 = \bar{r}_2 \\ r_3 = 0 \end{matrix} \wedge r_1 \neq r_2 \wedge r'_1 = r_1 \wedge r'_2 = r_2 + 1 \wedge r'_3 = r_3 + 1 \right)$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{matrix} r'_1 = r_1 = \bar{r}_1 \\ r'_2 = r_2 + 1 = \bar{r}_2 + 1 = \bar{r}_2 + (r_3 + 1) = \bar{r}_2 + r'_3 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{matrix} r'_1 = r_1 \\ r'_2 = \bar{r}_2 + r'_3 \end{matrix} \right\}$$

$$\Rightarrow A \begin{matrix} r_1 & r_2 & r_3 \\ r'_1 & r'_2 & r'_3 \end{matrix}$$

$$\bullet (A \wedge r_1 \neq r_2 \wedge r'_1 = r_1 \wedge r'_2 = r_2 + 1 \wedge r'_3 = r_3 + 1) \rightarrow A \begin{matrix} r_1 & r_2 & r_3 \\ r'_1 & r'_2 & r'_3 \end{matrix}$$

$$\left( \begin{matrix} r_1 = \bar{r}_1 \\ r_2 = \bar{r}_2 + r_3 \end{matrix} \right) \wedge r_1 \neq r_2 \wedge r'_1 = r_1 \wedge r'_2 = r_2 + 1 \wedge r'_3 = r_3 + 1$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{matrix} r'_1 = r_1 = \bar{r}_1 \\ r'_2 = r_2 + 1 = \bar{r}_2 + r_3 + 1 = \bar{r}_2 + r'_3 \end{matrix} \right\}$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{matrix} r'_1 = \bar{r}_1 \\ r'_2 = \bar{r}_2 + r'_3 \end{matrix} \right\} \equiv A \begin{matrix} r_1 & r_2 & r_3 \\ r'_1 & r'_2 & r'_3 \end{matrix}$$

$$\bullet (A \wedge r_1 = r_2 \wedge r'_1 = r_3 \wedge r'_2 = r_2 \wedge r'_3 = r_3) \rightarrow r'_1 = \bar{r}_1 - \bar{r}_2$$

$$\left( \begin{array}{l} r_1 = \bar{r}_1 \\ r_2 = \bar{r}_2 + r_3 \end{array} \right) \wedge r_1 = r_2 \wedge r'_1 = r_3 \wedge r'_2 = r_2 \wedge r'_3 = r_3$$

$$\Rightarrow r'_1 = r_3 = r_2 - \bar{r}_2 = r_1 - \bar{r}_2 = \bar{r}_1 - \bar{r}_2$$

$$\Rightarrow r'_1 = \bar{r}_1 - \bar{r}_2$$

## ESEMPIO

$I_1 : J(1,2,6)$

$I_2 : S(2)$

$I_3 : S(3)$

$I_4 : J(1,2,6)$

$I_5 : J(1,1,2)$

$I_6 : T(3,1)$

if  $R_1 = R_2$  then goto 6

[2]  $R_2 \leftarrow R_2 + 1$

$R_3 \leftarrow R_3 + 1$

if  $R_1 = R_2$  then goto 6

if  $R_1 = R_3$  then goto 2

[6]  $R_1 \leftarrow R_3$

CONDIZIONI  
INIZIALI


$$\left\{ \begin{array}{l} r_1 = \bar{r}_1 \\ r_2 = \bar{r}_2 \\ r_3 = 0 \end{array} \right.$$

## TERMINAZIONE

CONDIZ. INIZIALI\*  $\equiv$  CONDIZ. INIZIALI  $\wedge \bar{r}_2 \leq \bar{r}_1$

$A^* \equiv A \wedge r_2 \leq r_1$

FUNZIONE MISURA  $\equiv r_1 - r_2$



CONDIZIONE  
FINALE

$$\{ r_1 = \bar{r}_1 - \bar{r}_2 \}$$

## CONDIZIONI DI VERIFICA

- (CONDIZIONI INIZIALI\*  $\wedge r_1 = r_2 \wedge r'_1 = r_3 \wedge r'_2 = r_2 \wedge r'_3 = r_3$ )  $\rightarrow r'_1 = \bar{r}_1 - \bar{r}_2$
- (CONDIZIONI INIZIALI\*  $\wedge r_1 \neq r_2 \wedge r'_1 = r_1 \wedge r'_2 = r_2 + 1 \wedge r'_3 = r_3 + 1$ )  $\rightarrow A^{*r_1 r_2 r_3}_{r'_1 r'_2 r'_3}$
- ( $A^*$   $\wedge r_1 \neq r_2 \wedge r'_1 = r_1 \wedge r'_2 = r_2 + 1 \wedge r'_3 = r_3 + 1$ )  $\rightarrow A^{*r_1 r_2 r_3}_{r'_1 r'_2 r'_3}$
- ( $A^*$   $\wedge r_1 = r_2 \wedge r'_1 = r_3 \wedge r'_2 = r_2 \wedge r'_3 = r_3$ )  $\rightarrow r'_1 = \bar{r}_1 - \bar{r}_2$

## CONDIZIONE DI TERMINAZIONE

$$(A^* \wedge r_1 \neq r_2 \wedge r'_1 = r_1 \wedge r'_2 = r_2 + 1 \wedge r'_3 = r_3 + 1) \rightarrow (r'_1 - r'_2 < r_1 - r_2)$$

$$(A^* \wedge r_1 \neq r_2 \wedge r'_1 = r_1 \wedge r'_2 = r_2 + 1 \wedge r'_3 = r_3 + 1)$$

$$\Rightarrow r'_1 - r'_2 = r_1 - r_2 - 1 < r_1 - r_2$$



PERTANTO IL NOSTRO PROGRAMMA CALCOLA LA FUNZIONE

$$f(x, y) = \begin{cases} x - y & \text{SE } x \geq y \\ ? & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

- STUDIAMO LA CONDIZIONE INIZIALE  $\bar{r}_1 < \bar{r}_2$   
 IN TAL CASO POSSIAMO DIMOSTRARE CHE VALE L'INVARIANTE

$$\bar{A} \equiv A \wedge r_1 < r_2$$

E QUINDI IL TEST DELL'ISTRUZIONE  $I_4: J(1, 2, 6)$   
 DARÀ IN QUESTO CASO ESITO SEMPRE NEGATIVO E IL SUCCESSIVO  
 CONTROLLO  $I_5: J(1, 1, 2)$  RIPORTERÀ A 2 IL VALORE DEL  
 CONTATORE DI PROGRAMMA.

NE SEGUE CHE CON CONDIZIONE INIZIALE  $\bar{r}_1 < \bar{r}_2$ , IL  
 NOSTRO PROGRAMMA NON SI FERMA MAI E QUINDI LA FUNZIONE  
 CALCOLATA È:

$$f(x, y) = \begin{cases} x - y & \text{SE } x \geq y \\ \uparrow & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

