

## DECIDIBILITÀ, INDECIDIBILITÀ E PARZIALE DECIDIBILITÀ

- RICORDIAMO CHE UN PREDICATO  $M(\vec{x})$  È DECIDIBILE SE LA SUA FUNZIONE CARATTERISTICA

$$C_M(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{SE } M(\vec{x}) \text{ VALE} \\ 0 & \text{SE } M(\vec{x}) \text{ NON VALE} \end{cases}$$

È CALCOLABILE.

- ALTRIMENTI SI DICE INDECIDIBILE
- ALTRI MODI USATI PER ESPRIMERE CHE UN PREDICATO È DECIDIBILE SONO:

RICORSIVO

RICORSIVAMENTE DECIDIBILE

RISOLVIBILE

RICORSIVAMENTE RISOLVIBILE

CALCOLABILE

HA IL PROBLEMA DELLA  
DECISIONE RICORSIVO

- UN ALGORITMO PER CALCOLARE  $c_M$  E' DETTO  
PROCEDURA DI DECISIONE

## PROBLEMI INDECIBILI NELLA TEORIA DELLA CALCOLABILITÀ

TEOREMA IL PROBLEMA " $x \in W_x$ " È INDECIBILE  
[ " $\phi_x(x) \downarrow$ ", " $P_x(x) \downarrow$ ", " $\psi_U(x, x) \downarrow$ " SONO FORMULAZIONI  
EQUIVALENTI A " $x \in W_x$ " ]

DIM. OCCORRE DIMOSTRARE CHE LA FUNZIONE

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{SE } x \in W_x \\ 0 & \text{SE } x \notin W_x \end{cases}$$

NON È CALCOLABILE.

- PROCEDIAMO PER ASSURDO FACENDO VEDERE CHE SE  $f$  FOSSE CALCOLABILE RIUSCIREMMO A COSTRUIRE UNA FUNZIONE CALCOLABILE  $g$  DIVERSA DA TUTTE LE FUNZIONI CALCOLABILI!



- SUPPONIAMO PERTANTO CHE  $f$  SIA CALCOLABILE

- PONIAMO

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \notin W_x \\ \uparrow & \text{se } x \in W_x \end{cases} = \begin{cases} 0 & \text{se } f(x) = 0 \\ \uparrow & \text{se } f(x) = 1 \end{cases}$$

- PER LA TESI DI CHURCH,  $g$  È CALCOLABILE

- D'ALTRA PARTE,

$$x \in \text{Dom}(g) \iff x \notin W_x, \text{ PER OGNI } x \in \mathbb{N}$$

È QUINDI

$$\text{Dom}(g) \neq W_x, \text{ PER OGNI } x \in \mathbb{N}$$

- NE SEGUE CHE  $g$  È DIVERSA DA TUTTE LE FUNZIONI CALCOLABILI, ASSURDO

- SI CONCLUDE CHE  $f$  NON È CALCOLABILE

TEOREMA ESISTE UNA FUNZIONE CALCOLABILE  $h$  TALE  
CHE I PROBLEMI " $x \in \text{Dom}(h)$ " E " $x \in \text{Ran}(h)$ " SONO  
ENTRambi INDECIDIBILI

DM. SI PONGA

$$h(x) = \begin{cases} x & \text{SE } x \in W_x \\ \uparrow & \text{SE } x \notin W_x \end{cases}$$

- PER LA TESI DI CHURCH,  $h$  E' CALCOLABILE

CSI HA ANCHE  $h(x) = x \cdot \underline{1}(\Psi_{\sigma}(x, x))$

- PER OGNI  $x$ , SI HA

$$x \in \text{Dom}(h) \iff x \in W_x \iff x \in \text{Ran}(h)$$

PERTANTO I PROBLEMI " $x \in \text{Dom}(h)$ " E " $x \in \text{Ran}(h)$ "  
SONO INDECIDIBILI ■

TEOREMA ESISTE UNA FUNZIONE CALCOLABILE  $h$ , TALE



## TEOREMA (PROBLEMA DELLA FERMATA)

IL PROBLEMA " $\phi_x(y)$  E' DEFINITO" E' INDECIDIBILE

DM. [MEDIANTE RIDUZIONE]

- INFORMALMENTE, IL PROBLEMA " $\phi_x(x) \downarrow$ " E' "PIU' FACILE" DEL PROBLEMA " $\phi_x(y) \downarrow$ ", POICHE' IL PRIMO E' INDECIDIBILE NE SEGUE CHE ANCHE IL SECONDO LO E'.

- PIU' FORMALMENTE, SIA

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{SE } \phi_x(y) \downarrow \\ 0 & \text{SE } \phi_x(y) \uparrow \end{cases}$$

- SE  $g$  FOSSE CALCOLABILE, LO SAREBBE PURE LA FUNZIONE  $f(x) = g(x, x)$ , MA  $f$  E' LA FUNZIONE CARATTERISTICA DEL PROBLEMA " $\phi_x(x) \downarrow$ " E QUINDI NON E' CALCOLABILE. PERTANTO  $g$  NON E' CALCOLABILE. ■

## LA TECNICA DELLA RIDUZIONE

- SUPPONIAMO DI AVERE DUE PROBLEMI  $M_1(\vec{x})$  E  $M_2(y_1, \dots, y_n)$
- DICIAMO CHE  $M_1$  È RIDUCIBILE A  $M_2$  SE ESISTONO FUNZIONI TOTALI CALCOLABILI  $k_1(\vec{x}), \dots, k_n(\vec{x})$  TALI CHE
$$M_1(\vec{x}) \leftrightarrow M_2(k_1(\vec{x}), \dots, k_n(\vec{x})), \text{ PER OGNI } \vec{x}.$$
- SE  $M_1$  È RIDUCIBILE A  $M_2$ , OGNI PROCEDURA DI DECISIONE PER  $M_2$  DA' LUOGO AD UNA PROCEDURA DI DECISIONE PER  $M_1$ .
- PERTANTO, SE  $M_1$  È INDECIDIBILE, ANCHE  $M_2$  DEVE ESSERE INDECIDIBILE.



- PIÙ FORMALMENTE, SE  $M_2$  È DECIDIBILE, ALLORA LA FUNZIONE  $c_{M_2}(y_1, \dots, y_n)$  È CALCOLABILE.

QUINDI, ANCHE  $c_{M_2}(k_1(\vec{x}), \dots, k_n(\vec{x}))$  È CALCOLABILE.

MA  $c_{M_1}(\vec{x}) = c_{M_2}(k_1(\vec{x}), \dots, k_n(\vec{x}))$ , E QUINDI ANCHE

$c_{M_1}(\vec{x})$  RISULTA CALCOLABILE, CIOÈ  $M_1$  È DECIDIBILE

- IL TEOREMA S-M-N È UNO STRUMENTO MOLTO UTILE PER RIDURRE UN PROBLEMA AD UN ALTRO



TEOREMA IL PROBLEMA " $\phi_x = \underline{0}$ " E' INDECIDIBILE

DM

STRATEGIA

CERCARE UNA FUNZIONE TOTALE CALCOLABILE  $k(x)$  TALE CHE:

$$x \in W_x \iff \phi_{k(x)} = \underline{0}$$

- PONIAMO

$$f(x, y) = \begin{cases} \underline{0} & \text{SE } x \in W_x \\ \uparrow & \text{SE } x \notin W_x \end{cases}$$

- PER LA TESI DI CHURCH (OPPURE OSSERVANDO CHE

$f(x, y) = \underline{0}(\psi_{\sigma}(x, x))$ ,  $f$  E' CALCOLABILE

- QUINDI PER IL TEOREMA S-M-N ESISTE UNA FUNZIONE

TOTALE CALCOLABILE  $k(x)$  TALE CHE  $f(x, y) = \phi_{k(x)}(y)$

- PERTANTO

$$x \in W_x \iff f(x, y) = 0, \text{ PER OGNI } y$$

$$\iff \phi_{k(x)}(y) = 0, \text{ PER OGNI } y$$

$$\iff \phi_{k(x)} = \underline{0}$$

CIOE' IL PROBLEMA INDECIDIBILE  $x \in W_x$  E' STATO  
RIDOTTO AL PROBLEMA  $\phi_x = \underline{0}$ .

- NE SEGUE CHE ANCHE QUEST'ULTIMO DEVE ESSERE  
INDECIDIBILE ■



COROLLARIO IL PROBLEMA " $\phi_x = \phi_y$ " È INDECIDIBILE

DM.

- SIA  $c \in \mathbb{N}$  TALE CHE  $\phi_c = \underline{0}$ ,

- PERTANTO LA RIDUZIONE

$$"\phi_x = \underline{0}" \iff "\phi_x = \phi_c"$$

DEL PROBLEMA " $\phi_x = \underline{0}$ " AL PROBLEMA " $\phi_x = \phi_y$ "

DIMOSTRA CHE ANCHE IL PROBLEMA " $\phi_x = \phi_y$ " È INDECIDIBILE

- IN QUESTO CASO, SI SONO USATE LE FUNZIONI

$$k_1(x) = x$$

$$k_2(x) = c$$



TEOREMA SIA  $c \in \mathbb{N}$ , I SEGUENTI PROBLEMI SONO INDECIDIBILI:

(a) (PROBLEMA DELL'INPUT) " $c \in W_x$ "

(b) (PROBLEMA DELL'OUTPUT) " $c \in E_x$ "

DM RIDUCIAMO IL PROBLEMA " $x \in W_x$ " AD ENTRAMBI I PROBLEMI (a) E (b), SIMULTANEAMENTE.

- SIA

$$f(x, y) = \begin{cases} y & \text{SE } x \in W_x \\ \uparrow & \text{SE } x \notin W_x \end{cases}$$

- PER LA TESI DI CHURCH,  $f$  E' CALCOLABILE E QUINDI PER IL TEOREMA S-M-N ESISTE UNA FUNZIONE TOTALE CALCOLABILE  $k$  TALE CHE

$$f(x, y) = \Phi_{k(x)}(y)$$



- QUINDI

$x \in W_x \rightarrow \phi_{k(x)}(y) = y$ , PER OGNI  $y$

$\rightarrow W_{k(x)} = E_{k(x)} = N$

$\rightarrow c \in W_{k(x)} \quad \text{E} \quad c \in E_{k(x)}$

$x \notin W_x \rightarrow \phi_{k(x)}(y) \uparrow$ , PER OGNI  $y$

$\rightarrow W_{k(x)} = E_{k(x)} = \emptyset$

$\rightarrow c \notin W_{k(x)} \quad \text{E} \quad c \notin E_{k(x)}$

## TEOREMA DI RICE

SIA  $B \subseteq \mathbb{C}_1$ , TALE CHE  $B \neq \emptyset$  E  $B \neq \mathbb{C}_1$ .

ALLORA IL PROBLEMA " $\phi_x \in B$ " E' INDECIDIBILE.

D.M. SUPPONIAMO PER ASSURDO CHE IL PROBLEMA " $\phi_x \in B$ " SIA DECIDIBILE, CIOE' CHE LA FUNZIONE CARATTERISTICA

$$c_B(x) = \begin{cases} 1 & \text{SE } \phi_x \in B \\ 0 & \text{SE } \phi_x \notin B \end{cases}$$

SIA CALCOLABILE.

- POSSIAMO SUPPORRE, SENZA PERDITA DI GENERALITA', CHE  $f_\emptyset \notin B$ , DOVE  $f_\emptyset(x) \uparrow$  PER OGNI  $x \in \mathbb{N}$ . INFATTI, SE COSI' NON FOSSE, POTREMMO PROCEDERE SOSTITUENDO  $\mathbb{C}_1 \setminus B$  AL POSTO DI  $B$ , IN QUANTO  $c_{\mathbb{C}_1 \setminus B} = \text{sg} \circ c_B$  E' CALCOLABILE.



- SIA QUINDI  $g \in \mathcal{B}$  E PONIAMO

$$f(x, y) = \begin{cases} g(y) & \text{SE } x \in W_x \\ \uparrow & \text{SE } x \notin W_x \end{cases} = \begin{cases} g(y) & \text{SE } x \in W_x \\ f_\emptyset & \text{SE } x \notin W_x \end{cases}$$

- PER LA TESI DI CHURCH,  $f$  E' CALCOLABILE E QUINDI PER IL TEOREMA S-m-n ESISTE UNA FUNZIONE TOTALE CALCOLABILE  $k(x)$  TALE CHE

$$f(x, y) = \phi_{k(x)}(y).$$

- SI OSSERVI CHE

$$x \in W_x \rightarrow \phi_{k(x)} = g \rightarrow \phi_{k(x)} \in \mathcal{B}$$

$$x \notin W_x \rightarrow \phi_{k(x)} = f_\emptyset \rightarrow \phi_{k(x)} \notin \mathcal{B}$$

- PERTANTO ABBIAMO:

$$"x \in W_x" \leftrightarrow \underset{k(x)}{"}\phi \in B"$$

QOE' IL PROBLEMA  $"x \in W_x"$  E' STATO RIDOTTO AL PROBLEMA  $"\phi_x \in B"$ .

- QUINDI  $"\phi_x \in B"$  NON E' DECIDIBILE, ASSURDO

- IN CONCLUSIONE, L'IPOTESI INIZIALE CHE  $"\phi_x \in B"$  FOSSE DECIDIBILE PORTA A CONTRADDIZIONI, E QUINDI  $"\phi_x \in B"$  E' INDECIDIBILE

■



## ESERCIZI

1. DIMOSTRARE CHE I SEGUENTI PROBLEMI SONO INDECIDIBILI

(a) " $x \in E_x$ "

(b) " $W_x = W_y$ " [SI RIDUCA " $\phi_x$  E' TOTALE" A QUESTO PROBLEMA]

(c) " $\phi_x(x) = 0$ "

(d) " $\phi_x(y) = 0$ "

(e) " $x \in E_y$ "

(f) " $\phi_x$  E' TOTALE E COSTANTE"

(g) " $W_x = \emptyset$ "

(h) " $E_x$  E' INFINITO"

(i) " $\phi_x = g$ ", CON  $g$  UNA QUALSIASI FUNZIONE CALCOLABILE ASSEGNATA

2. DIMOSTRARE CHE NON ESISTE ALCUNA FUNZIONE TOTALE  
CALCOLABILE  $f(x,y)$  CON LA SEGUENTE PROPRIETA':  
"QUANDO  $P_2(y)$  SI FERMA LO FA IN AL PIU'  $f(x,y)$  PASSI"



# INDECIDIBILITA' IN ALTRE AREE DELLA MATEMATICA

## EQUAZIONI DIOFANTEE

SI A  $P(x_1, \dots, x_n)$  UN POLINOMIO NELLE VARIABILI  $x_1, \dots, x_n$ ,  
CON COEFFICIENTI INTERI.

L'EQUAZIONE  $P(x_1, \dots, x_n) = 0$ , OVE SI RICERCANO  
SOLUZIONI INTERE, E' DETTA EQUAZIONE DIOFANTEE

## X PROBLEMA DI HILBERT (1900)

ESISTE UN ALGORITMO IN GRADO DI STABILIRE PER OGNI  
DATA EQUAZIONE DIOFANTEA SE HA SOLUZIONE?

M. DAVIS, J. ROBINSON, H. PUTNAM E Y. MATIYASEVICH HANNO  
DIMOSTRATO CHE IL X PROBLEMA DI HILBERT HA  
SOLUZIONE NEGATIVA

## LOGICA MATEMATICA

IL PROBLEMA DELLA VALIDITA' PER LA LOGICA DEL PRIMO ORDINE E' INDECIDIBILE

## TEORIA DEI GRUPPI

## TEORIA DEGLI INSIEMI

...



## PREDICATI PARZIALMENTE DECIDIBILI

- SEBBENE LA FUNZIONE CARATTERISTICA DEL PREDICATO " $x \in W_x$ " NON SIA CALCOLABILE, LA SEGUENTE FUNZIONE

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{SE } x \in W_x \\ \uparrow & \text{SE } x \notin W_x \end{cases}$$

E' CALCOLABILE, PER LA TESI DI CHURCH OPPURE OSSERVANDO CHE  $f(x) = \underline{1}(\Psi_U(x, x))$

(FUNZIONE CARATTERISTICA PARZIALE PER " $x \in W_x$ ")

- UN ALGORITMO CHE CALCOLA LA  $f$  E' UNA PROCEDURA CHE DA' RISPOSTA CORRETTA SE  $x \in W_x$  E CHE NON SI FERMA SE  $x \notin W_x$

(PROCEDURA DI SEMI-DECISIONE PER " $x \in W_x$ ")

DEFINIZIONE UN PREDICATO  $M(\vec{x})$  È PARZIALMENTE DECIDIBILE  
SE LA SUA FUNZIONE CARATTERISTICA PARZIALE

$$f(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{SE } M(\vec{x}) \text{ VALE} \\ \uparrow & \text{SE } M(\vec{x}) \text{ NON VALE} \end{cases}$$

È CALCOLABILE



## ESEMPI

1. IL PROBLEMA DELLA FERMATA È PARZIALMENTE DECIDIBILE  
IN QUANTO LA SUA FUNZIONE CARATTERISTICA PARZIALE

$$f(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{SE } P_2(y) \downarrow \\ \uparrow & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

È CALCOLABILE

(PER LA TESI DI CHURCH, OPPURE OSSERVANDO CHE

$$f(x,y) = \perp(\Psi_D(x,y))$$

2. OGNI PREDICATO DECIDIBILE È PARZIALMENTE DECIDIBILE

(BASTA OSSERVARE CHE SE LA FUNZIONE CARATTERISTICA

$c_H(\vec{x})$  DI UN PREDICATO  $H(\vec{x})$  È CALCOLABILE, ALLORA

LA FUNZIONE  $c'_H(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{SE } c_H(\vec{x}) = 1 \text{ È CALCOLABILE} \\ \uparrow & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$ )



3. SE  $g(\vec{x})$  E' UNA FUNZIONE CALCOLABILE, IL PREDICATO  
" $\vec{x} \in \text{Dom}(g)$ " E' PARZIALMENTE DECIDIBILE

(BASTA OSSERVARE CHE LA SUA FUNZIONE CARATTERISTICA  
PARZIALE  $f(\vec{x})$  SODDISFA LA RELAZIONE  $f(\vec{x}) = \underline{1}(g(\vec{x}))$ )

4. IL PROBLEMA " $x \notin W_x$ " NON E' PARZIALMENTE DECIDIBILE  
(INFATTI, SE  $f$  E' LA SUA FUNZIONE CARATTERISTICA, <sup>PARZIALE</sup>  
 $x \in \text{Dom}(f) \iff x \notin W_x$ , PER CUI  $\text{Dom}(f) \neq W_x$  PER OGNI  
 $x \in \mathbb{N}$  E QUINDI  $f$  NON PUO' ESSERE CALCOLABILE)

## DUE CARATTERIZZAZIONI DEI PREDICATI PARZIALMENTE DECIDIBILI

TEOREMA UN PREDICATO  $M(\vec{x})$  È PARZIALMENTE DECIDIBILE SE E SOLO SE ESISTE UNA FUNZIONE CALCOLABILE  $g(\vec{x})$  TALE CHE:  $M(\vec{x}) \iff \vec{x} \in \text{Dom}(g)$

DM SE  $M(\vec{x})$  È PARZIALMENTE DECIDIBILE, ALLORA LA SUA FUNZIONE CARATTERISTICA PARZIALE  $f(\vec{x})$  È CALCOLABILE, ED INOLTRE VALE  $M(\vec{x}) \iff f(\vec{x})=1 \iff \vec{x} \in \text{Dom}(f)$   
IL VICEVERSA SEGUE DAL PRECEDENTE ESEMPIO 3. ■



TEOREMA UN PREDICATO  $M(\vec{x})$  È PARZIALMENTE DECIDIBILE SE E SOLO SE ESISTE UN PREDICATO DECIDIBILE  $R(\vec{x}, y)$  TALE CHE  $M(\vec{x}) \Leftrightarrow \exists y R(\vec{x}, y)$ . [RICERCA NON LIMITATA]

DIM SIA  $M(\vec{x})$  PARZIALMENTE DECIDIBILE E SIA  $f(\vec{x})$  LA SUA FUNZIONE CARATTERISTICA PARZIALE. ALLORA VALE  $M(\vec{x}) \Leftrightarrow f(\vec{x}) \downarrow \Leftrightarrow \vec{x} \in \text{Dom}(f) \Leftrightarrow (\exists t) H_n(e, \vec{x}, t)$  DOVE  $f = \phi_e^{(n)}$  E  $H_n(e, \vec{x}, t)$  È IL PREDICATO PRIMITIVO RICORSIVO CHE È VERO SE E SOLO SE  $P_e(\vec{x})$  SI FERMA IN AL PIÙ  $t$  PASSI

VICEVERSA, SIA  $R(\vec{x}, y)$  UN PREDICATO DECIDIBILE TALE CHE  $M(\vec{x}) \Leftrightarrow \exists y R(\vec{x}, y)$ .

LA FUNZIONE  $f(\vec{x}) = \mu y R(\vec{x}, y)$  È CALCOLABILE E VALE  $\vec{x} \in \text{Dom}(f) \Leftrightarrow (\exists y) R(\vec{x}, y) \Leftrightarrow M(\vec{x})$ .

PERTANTO, PER IL TEOREMA PRECEDENTE,  $M(\vec{x})$  RISULTA PARZIALMENTE DECIDIBILE. ■



## ALTRE PROPRIETA' DEI PREDICATI PARZIALMENTE DECIDIBILI

TEOREMA SE IL PREDICATO  $M(\vec{x}, y)$  E' PARZIALMENTE DECIDIBILE,  
TALE E' ANCHE IL PREDICATO  $(\exists y)M(\vec{x}, y)$

0117 SIA  $R(\vec{x}, y, z)$  UN PREDICATO DECIDIBILE TALE CHE

$$M(\vec{x}, y) \leftrightarrow (\exists z)R(\vec{x}, y, z)$$

ALLORA  $(\exists y)M(\vec{x}, y) \leftrightarrow (\exists y)(\exists z)R(\vec{x}, y, z) \leftrightarrow (\exists w)R(\vec{x}, (w)_1, (w)_2)$ .

POICHE' IL PREDICATO  $\lambda \vec{x}, w. R(\vec{x}, (w)_1, (w)_2)$  E' DECIDIBILE,  
PER IL TEOREMA PRECEDENTE IL PREDICATO  $(\exists y)M(\vec{x}, y)$  E'  
PARZIALMENTE DECIDIBILE. ■

NOTA IL PRECEDENTE TEOREMA ESPRIME IL FATTO CHE  
I PREDICATI PARZIALMENTE DECIDIBILI SONO CHIUSI RISPETTO  
ALL'OPERAZIONE DI QUANTIFICAZIONE ESISTENZIALE ■

COROLLARIO SE  $M(\vec{x}, y_1, \dots, y_m)$  E' PARZIALMENTE DECIDIBILE,  
TALE E' ANCHE IL PREDICATO  $(\exists y_1) \dots (\exists y_m) M(\vec{x}, y_1, \dots, y_m)$ .

### ESEMPIO

I SEGUENTI PREDICATI SONO PARZIALMENTE DECIDIBILI

(a) " $x \in E_y^{(m)}$ "

DIM " $x \in E_y^{(m)}$ "  $\leftrightarrow (\exists z_1) \dots (\exists z_m) (\exists t) (P_y(z_1, \dots, z_m) \downarrow x$  IN  
AL PIU' t PASSI)

$\leftrightarrow (\exists z_1) \dots (\exists z_m) (\exists t) S_m(y, \vec{z}, x, t)$

(b) " $W_x \neq \emptyset$ "

DIM " $W_x \neq \emptyset$ "  $\leftrightarrow (\exists y) y \in W_x \leftrightarrow (\exists y) (\exists t) P_x(y) \downarrow$  IN AL PIU' t PASSI

$\leftrightarrow (\exists y) (\exists t) H(x, y, t)$



TEOREMA UN PREDICATO  $M(\vec{x})$  È DECIDIBILE  
SE E SOLO SE SIA  $M(\vec{x})$  CHE not  $M(\vec{x})$  SONO  
PARZIALMENTE DECIDIBILI

DIM. SE  $M(\vec{x})$  È DECIDIBILE, TALE È ANCHE not  $M(\vec{x})$ .  
PERTANTO SIA  $M(\vec{x})$  CHE not  $M(\vec{x})$  RISULTANO ESSERE  
PARZIALMENTE DECIDIBILI.

VICEVERSA, SUPPONIAMO CHE  $M(\vec{x})$  E not  $M(\vec{x})$  SIANO  
PARZIALMENTE DECIDIBILI E SIANO  $c'_M$  E  $c'_{\text{not } M}$  LE  
RISPETTIVE FUNZIONI CARATTERISTICHE PARZIALI (CALCOLABILI).  
INFORMALMENTE, PER CALCOLARE LA FUNZIONE CARATTERISTICA  $c_M$   
DI  $M(\vec{x})$  POSSIAMO ESEGUIRE SIMULTANEAMENTE I PROGRAMMI  
 $P_1$  E  $P_2$  CHE CALCOLANO  $c'_M$  E  $c'_{\text{not } M}$ , RISPETTIVAMENTE.  
SE SI FERMA PRIMA  $P_1(\vec{x})$  PONIAMO  $c_M(\vec{x}) = 1$ , ALTRIMENTI  
PONIAMO  $c_M(\vec{x}) = 0$ . PER LA TESI DI CHURCH,  $c_M$  È CALCOLABILE. ■



COROLLARIO IL PREDICATO " $x \notin W_x$ " NON E' PARZIALMENTE DECIDIBILE

DUM SAPPIAMO CHE IL PREDICATO " $x \in W_x$ " E'

- PARZIALMENTE DECIDIBILE
- NON DECIDIBILE

QUINDI, PER IL TEOREMA PRECEDENTE, IL PREDICATO " $x \notin W_x$ " NON E' PARZIALMENTE DECIDIBILE. ■

TEOREMA SIA  $f(\vec{x})$  UNA FUNZIONE PARZIALE.

ALLORA  $f(\vec{x})$  È CALCOLABILE SE E SOLO SE IL PREDICATO

$$"f(\vec{x}) = y"$$

È PARZIALMENTE DECIDIBILE

DIM. SE  $f$  È CALCOLABILE, ALLORA  $f = \phi_e^{(n)}$  PER QUALCHE  $e$ .

QUINDI, POICHÈ

$$"f(\vec{x}) = y" \iff (\exists t) S_m(e, \vec{x}, y, t),$$

IL PREDICATO " $f(\vec{x}) = y$ " È PARZIALMENTE DECIDIBILE.

VICEVERSA, SUPPONIAMO CHE " $f(\vec{x}) = y$ " SIA PARZ. DECIDIBILE E

SIA  $R(\vec{x}, y, t)$  UN PREDICATO DECIDIBILE TALE CHE

$$"f(\vec{x}) = y" \iff (\exists t) R(\vec{x}, y, t)$$

POICHÈ  $f(\vec{x}) \downarrow \iff (\exists y) (\exists t) R(\vec{x}, y, t)$ , SI HA

$$f(\vec{x}) = (\mu z R(\vec{x}, (z)_1, (z)_2)),$$

DA CUI SEGUE CHE  $f$  È CALCOLABILE. ■

## ESERCIZI

1. DIMOSTRARE CHE I SEGUENTI PREDICATI SONO PARZ. DECIDIBILI

(a) " $E_x^{(n)} \neq \emptyset$ " ( $n$  FISSATO)

(b) " $\phi_x(y)$  E' UN QUADRATO PERFETTO"

(c) " $n$  E' UN NUMERO DI FERMAT, CIOE'  $\exists x, y, z > 0$  TALI  
CHE  $x^m + y^m = z^m$ "

2. SIANO  $M(\vec{x})$  E  $N(\vec{x})$  PREDICATI PARZ. DECIDIBILI.

DIMOSTRARE CHE " $M(\vec{x})$  and  $N(\vec{x})$ " E " $M(\vec{x})$  or  $N(\vec{x})$ "  
SONO ANCH'ESSI PARZ. DECIDIBILI.

VERIFICARE INVECE CHE "not  $M(\vec{x})$ " NON E' IN GENERALE  
PARZ. DECIDIBILE



3. SUPPONIAMO CHE  $M(\vec{x}, y)$  SIA PARZIALMENTE DECIDIBILE  
DIMOSTRARE CHE

(a)  $(\exists y < z) M(\vec{x}, y)$  E' PARZ. DECIDIBILE

(b)  $(\forall y < z) M(\vec{x}, y)$  E' PARZ. DECIDIBILE

(c)  $(\forall y) M(\vec{x}, y)$  NON E' NECESSARIAMENTE PARZ. DECIDIBILE

4. SUPPONIAMO CHE  $M(x_1, \dots, x_n)$  SIA PARZ. DECIDIBILE E  
SIANO  $g_1, \dots, g_m$  FUNZIONI TOTALI CALCOLABILI.

DIMOSTRARE CHE IL PREDICATO  $N(\vec{y}) \equiv M(g_1(\vec{y}), \dots, g_n(\vec{y}))$   
E' PARZ. DECIDIBILE